

2023년 3차 의약품 관리위원회 신청약 심의결과

구분	약품명	성분명	보험수가	적응증/용법용량	결과
1	[전문] 아탄트 캡슐 80mg, 125mg 에이스파마	aprepitant 80mg, 125mg	6,571원/80mg 8,074원/125mg	CINV(항암화학요법 구역구토) 예방 :Highly~moderate Emetogenic CTx, : D1: 125mg->D2~3 : 80mg *dexa, 5-HT3 antagonist 병용	원내/외 통과 ([원내/외]에멘드캡슐80mg, 125mg, 에멘드주 대체)
2	[전문] 유로시트라K 서방정 한국팜비오	Potassium citrate 1080mg (10mEq as K)	194원/정 582원/day	칼슘결석 신세뇨관 산증, 저구연산염뇨성 수산칼슘 신결석증, 요산결석증: 저구연산염 뇨증 (>150mg/day/구연산염(urine): 1회 10mEq, 1일 3회 식중 중증 구연산염 뇨증:(<150mg/day/구연산염(urine): 60mEq/day #3~4	원내/외 통과 (원외->원내/외 전환)
3	[전문] 베오바정 제일제약	vibegron 50mg	비급여	과민성 방광: 배뇨 절박감, 빈뇨 및 절박성 요실금 증상 I: 1일 1회 50mg	원외통과
4	[전문] 리피딜 엔티정 한국애보트	fenofibrate 145mg	339원/정	원발성 고지혈증:고콜레스테롤혈증(IIa), 고콜레스테롤혈증+고TG혈증(IIb+III), 고TG혈증(IV): 1일 1회 145mg, 식사무관	원내/외 통과 ([원내/외]리피딜슈프라정160mg 대체)
5	[전문] 엑시글루정 10mg 종근당	dapagliflozin 10mg	407원/10mg	T2DM : 1일 1회 10mg (초기: 5mg or 10mg)	원외통과
6	[전문] 엑시글루엠 서방정 10/500mg, 10/1000mg 종근당	dapagliflozin/Met 10/500mg, 10/1000mg	₩473원/10/500mg ₩512원/10/1000mg	dapagliflozin/Met 병동 투여 적합한 성인 T2DM : 1일 1회 1정 with dinner 초기: 1회 5/500mg or 10/500mg ->용량 개별화, max. 10/2000mg	원외통과
7	[전문] 제미다파정 50/10mg 엘지화학	gemigliptin 50mg dapagliflozin 10mg	940원/정	gemigliptin/dapagliflozin 병동 투여 적합한 성인 T2DM : 1일 1회 1정 (식사무관)	원외통과
8	[전문] 울트라셋 ER 세미정 한국얀센	AAP 325mg+tramadol 37.5mg (서방+속방)	264원/정	중증도~중증 만성 통증 : 초회 2정->12시간 간격이상 1일 최대 8정	원내/외 통과 (원외->원내/외 전환)
9	[전문][향정] 잘레딤캡슐 5mg, 10mg 부광약품	zaleplon 5mg, 10mg	102원/5mg 153원/10mg	불면증 단기치료: 1일 1회 hs, 10mg(저체중: 5mg), max. 20mg/day	원내/외 통과 ([원내/외]조피스타정1mg 원외전환)
10	[일반] 포비정 노바엠헬스케어	benfotiamine 50mg, pyridoxine HCl 50mg, folic acid 0.25mg, cyanocobalamin 0.2mg	비급여	비타민 B1, B6, B9,B12 보급: 12세이상~성인: 1일 2회, 1회 1정 또는 1일 1회 2정	원내/외 통과
11	[전문] 유센스 질크림 50g/tub 한국팜비오	estriol 1mg/g	비급여	에스트로젠 결핍으로 인한 외음질 질환 및 증상: 1일 1회 본제 0.5g(estriol 0.5mg) 2~3주 질내 투여유지: 1회량 주 2회	원외통과
12	[전문] 니세골린 정 10mg, 30mg 한미약품	nicergoline 10mg, 30mg	165원/10mg 424원/30mg	10mg : 뇌경색 후유증 수반 만성뇌순환장애에 의한 의욕저하 개선, 노인 동맥경화성 두통, 고혈압의 보조요법 : 1회 5-10mg, 1일 2-3회 식전 30mg :1차성 퇴행성 혈관치매 및 복합성치매와 관련된 다음 치매중후군 일차적 치료: 기억력 손상, 집중력장애, 판단력장애, 적극성 부족: 1일 1회 30mg 식전 투여 (max 60mg/d)	원외통과 ([원내/외]사미온정 10mg 대체)
13	[일반] 크리롤액 20ml/포 한국파마	polyethylene glycol 4000 10g/20ml/포	비급여	변비: 8세이상 ~ 성인: 10일 20~40ml 물에 타서 복용(증상에 따라 어린이 2일 1회 복용가능->max. 3개월) onset : 24~48시간이내	원외통과 ([원내/외]마이락산 원외전환)