

2019년 7차 약사위원회 통과 신약

| No. | 약효<br>분류        | 약품명/성분명/제조사(판매사)  | 적응증   | 용법/용량                          | 신청사유   |
|-----|-----------------|---|---|--------------------------------|--|
| 1   | 항혈소판제, 섬유소용해제   | [전문의약품]<br><b>프레탈 서방캡슐 200mg</b><br><b>cilostazol (micronized) 200mg</b><br><b>오츠카</b>  | 만성 동맥폐색증(버거씨병, 폐색성 동맥경화증, 당뇨병성 말초혈관병증 등)에 의한 궤양, 동통 및 냉감 등 허혈성 증상상의 개선. 뇌경색(심인성 뇌색전증 제외) 발증 후 재발 억제.  | 성인 1일 1회 200mg, 공복시.           | <b>원내/외 통과</b><br><b>(프레탈®정 100mg</b><br><b>완전 대체)</b> |
| 2~3 | 항고지혈증제          | [전문의약품]<br><b>리포로우 정 40mg</b><br><b>Atorvastatin 40mg</b><br>[전문의약품]<br><b>리포로우 정 80mg</b><br><b>Atorvastatin 80mg</b><br><b>(주)종근당</b> | 1. 고지혈증(원발성 고콜레스테롤혈증 및 복합형 이상지질혈증): 1일 1회 10mg (max. 80mg/day)<br>2. 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증: 1일 1회 10~80mg<br>3. 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증: 소아(10~17세): 초회 1일 10mg (max. 20mg/day) |                                | <b>원외 통과</b>   |
| 4   | 제산제, 항역류제, 항궤양제 | [전문의약품]<br><b>프로맥 정</b><br><b>polaprezinc 75mg</b><br><b>에스케이케미칼 생명과학</b>   | • 위궤양, 급·만성위염 급성악화기의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종) 개선.  | 성인: 1회 75mg, 1일 2회(아침식후, 취침전). | <b>원외 통과</b>   |
| 5   | 자궁용제            | [전문의약품][희귀의약품]<br><b>메틸러</b><br><b>methylergonovine 0.125mg</b><br><b>Adeka Ilac Sanayi ve Ticaret A.S./지오영</b>                         | • 자궁 수축 불능 및 임신 이전 상태 복귀와 관련 지어 낙태, 제왕 절개 수술 또는 분만 후 자궁 출혈 예방 및 치료 시<br>• 불완전한 낙태 시, 자궁 내용물 외부 배출 촉진 시<br>• 산후 질 분비물이 (출산 후 자궁에서 나오는 분비물) 나오지 않을 경우 사용.               | 하루 2 회 내지 3 회 당의정 2정을 복용       | <b>원내/외 통과</b>   |
| 6   | 혈압강하제           | [전문의약품]<br><b>애니디핀 에스 정 2.5mg</b><br><b>S-amlodipine 2.5mg</b><br><b>(주)종근당</b>   | 고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄 또는 관상혈관계의 혈관경련수축에 의한 심근성허혈증.  | 성인: 1일 1회 2.5mg, 1일 최대 5mg     | <b>원내/외 통과</b>   |