

분류	약품명/성분명/제조사	보험수가	적응증	용법/용량	심의결과
항결핵제	튜비스투 정 150/300mg isoniazid 150mg, rifampicin 300mg 비씨월드	₩314/정	폐결핵.	성인: 1일 1회 2정(식전1시간)	원내외 통과
항결핵제	튜비스 정 isoniazid 75mg, pyrazinamide 400mg, rifampicin 150mg, ethambutol HCl 275mg 비씨월드	₩394/정	8세 이상의 결핵 치료.	1일 1회 식전 1시간 30~37kg: 2정. 38~54kg: 3정. 55~70kg: 4정 71kg이상: 5정	원내외 통과
질질한 치료제	클리눔 질정 dequalinium chloride 10mg 현대	비급여	세균성 및 진균성(칸디다성) 질염.	1일 1회 1정, 연속 6일간(저녁 취침 전), 질 내 깊숙이 삽입. 증상 호전이 관찰되더라도 6일간 투여를 지속.	원내외 통과 [원내외]카마졸질 정 대체
PPIs	파리에트정 5mg (장용정) rabeprazole 5mg 한국콜마/한국에자이	₩356/정	위십이장 궤양 과거력이 있는 환자에서 1일 100mg 이하 저용량 아스피린 투여에 의한 위십이장 궤양 예방	1일 1회 5mg	원외 통과
말초혈관 확장제, 뇌기능 개선제	징카민 정 40mg 80mg ginkgo leaf dried extract 40mg, 80mg 영진	₩120/40mg ₩180/80mg	말초동맥 순환장애. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명. 이명·두통·기억력감퇴·집중력장애·우울감·어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료.	말초동맥순환장애, 어지러움, 이명: 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회. 기질성 뇌기능장애: 1회 40-80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회.	원외 통과 [원외]타나민 정 대체
말초혈관 확장제, 뇌기능 개선제	칼리노 정 kallidinogenase 50IU 아이큐어	₩209/정	고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염에 의한 말초순환장애, 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선.	1일 30-150I.U. 3회 분할 경구 투여.	원외 통과 [원외]뉴본 정 대체
항파킨슨 용제	트리레보 정 levodopa/carbidopa/entacapone 50/12.5/200mg 75/18.75/200mg 100/25/200mg 150/37.5/200mg 200/50/200mg 명인	₩953/정 ₩846/정 ₩947/정 ₩1,023/정 ₩1,055/정	레보도파/도파탈탄산효소 억제제 표준치료제로 개선되지 않는 파킨슨씨병 환자의 운동 동요 증상의 치료.	1회 1정, 음식물과 함께 또는 단독으로 경구투여. 1일 최대 10정 (200/50/200mg은 1일 최대 7정)	원내외 통과 [원내/외]스타레보정 대체(생산중단)
항혈소판제	프리그렐정 clopidogrel_resinate 75mg 종근당	₩914/정	허혈뇌졸중,심근경색 또는 말초 동맥성 질환이 있는 성인에서 죽상동맥경화성 증상: 1일 1회 75mg 급성 관상동맥증후군: (부하용량)1일 1회 300mg, 유지용량: 1일 1회 75mg, 1일 1회 아스피린 75~325mg 병용 심방세동-죽상혈전증 및 혈전색전증 위험성 감소: 1일 1회 75mg, 1일 1회 아스피린 75~100mg 병용		원내외 통과