

약효 분류	약품명/성분명/제조사(판매사)	보험수가 /Daily cost	적응증	용법/용량	심의 결과
기타 항생제	[전문의약품] 자이복스 정 600mg linezolid 600mg 화이자	₩32,421/정	1. 병원내감염 패렴, 지역감염 패렴 , 합병증 동반한 피부 및 연조직 감염: • 만 12세 이상: 600mg q12hr 10-14days • 신생아-만 11세: 10mg/kg q8hr 10-14days 2. 합병증 동반하지않은 피부 및 연조직 감염 : • 성인: 400mg q12hr • 만12-17세: 600mg q12hr 10-14일간. • 만 5세 미만: 10mg/kg q8hr, • 만 5-11세 10mg/kg q12hr 10-14일간. 3. VRE 감염(세균혈증을 동반한 경우도 포함) : • 만 12세 이상: 600mg q12hr 14-28일간. • 신생아-만 11세: 10mg/kg q8hr 14-28일간. 4. 성인 MRSA 감염 : 600mg q12hr		원의 통과
심질환용제	[전문의약품][희귀의약품] 황산퀴니딘 정 quinidine sulfate 200mg Watson Laboratories, Inc./ 희귀의약품센터	비급여 (400원/정)	말라리아, 부정맥 1) 심방 세동/조동에서 동율동으로의 전환: 디기탈리스나 베타차단제로 증상 조절 실패시 사용 q6hrs, 400mg: 4~5번 투여받은 후에 전환이 일어나지 않으면, 용량을 증가시킴 2) 심방 세동/조동으로 방출 빈도의 감소: q6hrs, 200mg (역가 166mg)으로 시작, 용량 서서히 증가.		원의 통과
항고지혈제	[전문의약품] 보령 퀘스트란 현탁용산 cholestyramine resin 4g/9g/포 보령	₩614/포	원발성 고지혈증:고콜레스테롤혈증(IIa), 고콜레스테롤혈증과 고TG혈증 복합형(IIb형), 담도 폐쇄에 의한 가려움증, 고콜레스테롤혈증에 의한 관동맥질환의 발병 위험성 감소	1회 4g(1포) 1일 1-6회 160-180mL의 물 또는 비탄산음료에 현탁시켜 복용.	원의 통과
골대사 제제	[전문의약품] 이베니티 주 프리필드시린지 romosozumab 105mg*2PFS/pack 암젠코리아	비급여	골절의 위험성이 높은 폐경 후 여성 골다공증 환자의 치료 골절의 위험성이 높은 남성 골다공증 환자의 골밀도 증가	• 1회 210 mg(105 mg을 다른 투여부위로 연속 2번), • 월 1회, 총 12회 피하 주사. • 칼슘, 비타민 D 보조제 추가 복용 필요.	원내외 통과
골대사 제제	[전문의약품] 테로사 카트리지 주 2.4ml teriparatide 250µg/mL 대원	₩219,550/2.4mL/ 카트리지	폐경기 이후 여성 및 골절의 위험이 높은 남성에 대한 골다공증의 치료. 골절의 위험이 높은 여성 및 남성에 있어서 지속적인 글루코코르티코이드 요법과 관련된 골다공증의 치료.	1일 1회 20mcg, 대퇴부 또는 복부 피하주사. 최대 24개월 투약 가능. * Device(pen): 의료기기로 분류 별도 필요	원의 통과
기타 비뇨생식 기계용약	[전문의약품] 스파스몰리트 당의정 trospium chloride 20mg 부광	₩277/정	하부요로 폐쇄에 의하지 않은 방광기능 이상에 의한 빈뇨, 야간 다뇨, 과민성 방광, 절박요실금.	성인 1회 20mg, 1일 2회.	원내외 통과
해독제, 약물 의존성 치료제	[전문의약품] 벨포로 슈여블정 sucroferric oxyhydroxide 2500mg 프레제니우스	₩1,697/정	혈액투석 또는 복막투석을 받고 있는 만성신장질환자의 혈철 인 조절	• 1일 3정 (철로서 1,500 mg), 매 식사와 함께 1정씩 씹어서 복용. • 유지 용량: 적정 혈철 인 수치로 조절될 때까지 1일 1정(철로서 500 mg)씩 2-4 주 간격으로 증량 또는 감량. • 1일 최대 6정 (철로서 3,000 mg).	[원내/외]암포젤정 코드종료
최면, 진정제	[전문의약품] 멜라토 서방정 2mg melatonin 2mg 한림	비급여 (₩790/정)	수면의 질이 저하된 55세 이상의 불면증 환자의 단기치료.	1일 1회 1정, 식사 후 취침 1-2시간 전, 최대 13주까지 투여.	원내외 통과 [원내/외]써카딘 서방정 대체
면역억제제	[전문의약품] 셀셉트 캡슐 250mg mycophenolate mofetil 250mg 로슈	₩858/cap	동종 신장·심장·간장 이식환자에 대한 급성 장기 거부반응 방지. 시클로스포린 및 코르티코스테로이드와 병용해야 함.	1. 신장이식:(성인)1회 1g 1일 2회 소아 및 청소년(2~18세) : • 1.25 ~ 1.5 m2 : 1회 750 mg 1일 2회 • 1.5 m2 초과 : 1회 1.0 g 1일 2회 2. 심장이식: 성인 :1회 1.5 g 1일 2회 3. 간장이식 : 성인 : 1회 1.5 g 1일 2회	원의 통과
ACE 저해제/레닌 억제제	[전문의약품] 아서틸 아르기닌 정 5mg perindopril arginine 5mg	₩529/정	고혈압, 울혈성심부전(비칼륨보전 이노제 및 디기탈리스 투여시의 보조치료제), 안정형 관상동맥 질환: 심근경색 및/또는 혈관재생술의 병력이 있는 안정형 관상동맥질환 환자에서 심혈관 질환으로 인한 사망 또는 비치명적 심근경색에 대한 위험성 감소.	• 고혈압: 1일1회 5mg->1개월후 1일1회 10mg • 울혈성심부전: 1일 1회 2.5mg, 2주후-> 5mg 증량 • 중증 울혈성 심부전, 고령자, 초기 동맥압 매우 낮은 환자, 신기능장애, 고용량 이노제 투여받는 자: 1일 1회 1.25mg. • 안정형 관상동맥 질환: 초회량 2주 동안 1일 1회 5mg, 그 후 내약성에 따라 1일 1회 10mg.	원내외 통과 [원내/외]아서틸 정 4mg 대체
	[전문의약품] 아서틸 아르기닌 정 10mg perindopril arginine 10mg 세르비에	₩792/정			원의 통과 [원외] 아서틸 정 8mg 대체
에스트로겐, 프로게스테론, 관련제제	[전문의약품] 프레미나 정 0.3mg conjugated equine estrogens 0.3mg	₩121/정	1. 성선기능저하증, 난소적출, 난소기능부전으로 인한 저에스트로겐증. 1)성선기능저하증: 1일 2.5-7.5mg 3주간 투여, 1주간 휴약. 2)난소적출 및 난소기능부전: 1일 1.25mg 3주간 투여, 1주간 휴약. 2. 위축성 질염, 외음위축증, 갱년기장애 : 1일 0.3-1.25mg 월경주기 제 5일부터 주기적(3주간 투여 후 1주간 휴약) 또는 비주기적으로 투여. 증상 호전시까지 반복. 3. 기능성 자궁출혈 : 1일 0.625-3.75mg 출혈이 멈출 때까지 분할 투여, 그 후 20일간 동일 용량 투여. 4. 골다공증 : 1일 0.625-1.25mg 월경주기 제 5일부터 주기적(3주간 투여 후 1주간 휴약) 또는 비주기적 투여. 증상이 호전될 때까지 반복. 5. 폐경 후의 유방암(경감용) : 1회 10mg 1일 3회 최소 3개월간 투여. 6. 수술불능의 진행성 전립선암(경감용) : 1회 1.25-2.5mg 1일 3회 투여.		원의 통과
	[전문의약품] 프레미나 정 0.625mg conjugated equine estrogens 0.625mg 다림비아오텍	₩186/정			