

약 품 분 류	약품명/성분명/제조사(판매사)	보험수가	적응증	용법/용량	심의 결과
신경통 치료제, 항경련제	[전문의약품][함량추가] 리리카 캡슐 25mg pregabalin 25mg	₩275/cap	성인에서 말초와 중추 신경병증성 통증의 치료, 간질: 성인에서 이차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작의 보조제, 섬유근육통의 치료.	1일 총 투여량을 1일 2회 분복. 음식물과 상관없이 투여. 1. 신경병증성 통증: 1) 말초 신경병증성 통증: 초회 1일 150mg. 3-7일 후 1일 300mg까지 증량 가능. 필요시 이후 7일 간격으로 1일 최대 600mg까지 증량. 2) 중추 신경병증성 통증: 초회 1일 150mg. 1주 후 1일 300mg까지 증량 가능. 추가로 1주 후 목표용량인 1일 600mg까지 증량. 2. 간질: 성인 초회 1일 150mg. 1주 후 1일 300mg까지 증량 가능. 필요시 이후 7일 간격으로 1일 최대 600mg까지 증량. 3. 섬유근육통: 1일 300-450mg. 초회 75mg씩 1일 2회. 1주 내 150mg씩 1일 2회로 증량 가능. 필요시 1주 내 225mg씩 1일 2회까지 증량 가능. 1일 최대 450mg.	원외 통과 [원내외] → [원외] 전환 • 리리카 300mg • 뉴론틴정 600mg • 가바페닌캡셀 100mg • 가바페닌캡셀 300mg • 듀록타캡셀 60mg [원외] → 코드종료 • 뉴론틴캡셀 400mg • 네버팬틴정 600mg
	[전문의약품][함량추가] 리리카 캡슐 50mg pregabalin 50mg Pfizer Inc.	₩439/cap			
제산제, 역류 억제제, 소화성 궤양 치료제	[전문의약품] 스토가 정 10mg lafutidine 10mg 보령제약	₩153/정	1. 위·십이지장궤양의 단기치료: 1회 10mg, 1일 2회 오전 및 취침전. 2. 급·만성위염의 위점막 병변의 개선: 1일 1회 10mg을 취침전. 3. H. pylori에 감염된 소화기 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법: 라푸티딘 20mg, 클레리스로마이신 500mg, 아목시실린 1000mg을 1일 2회 7일간 또는 14일간. 4. 마취전투약: 1회 10mg, 2회(수술전날 취침전, 수술당일 마취투여 2시간전). 5. 역류성 식도염 치료: 1회 10mg, 2회.		원외 통과 • [원외] 룩산캡셀75mg 코드종료
신경통 치료제, 항경련제	[전문의약품] 네버팬틴 100mg gabapentin 100mg 대웅바이오	₩198/cap	1. 간질 1) 만 13세 이상 환자의 단독 및 부가요법: 유지용량 900mg/day. 첫째날: 300mg을 1일 1회 또는 100mg을 1일 3회, 둘째날: 300mg을 1일 2회 또는 100mg 2캡슐을 1일 3회, 셋째날부터 300mg을 1일 3회 또는 100mg 3캡슐을 1일 3회. 또는 시작용량으로 300mg 1캡슐 1일 3회 가능, 1일 최대 2,400mg. 2) 만 3-12세 이하에 대한 부가요법: 유지용량 30mg/kg/day. 첫째날: 10mg/kg, 둘째날: 20mg/kg, 셋째날부터 1일 30mg/kg, 필요시 40mg/kg/day까지 증량. 1일 총투여량은 3회 분복. 2. 신경병증성 통증 18세 이상: 유지용량 900mg/day. 첫째날: 300mg 1일 1회 또는 100mg 1일 3회, 둘째날: 300mg 1일 2회 또는 100mg 2캡슐을 1일 3회, 셋째날부터 본제 300mg을 1일 3회 또는 100mg 3캡슐을 1일 3회. 또는 시작용량으로 본제 300mg을 1일 3회, 필요시 일주일내 1,800mg/day까지 증량. 1일 최대 3,600mg. 본제 투여 시 1일 총투여량은 3회로 분복.		원내/외 통과 (응급 통과)