

약효 분류	약품명/성분명/제조사(판매사)	보험수가 /Daily cost	적응증	용법/용량	심의 결과
항갑상선제	[전문의약품] 한국콜마 젤스테인 용액 (1btl=10mL) (100mℓ 중) iodine 5g, potassium iodide 10g 한국콜마/지-리페	비급여	갑상선 기능 항진증에 대한 수술 전 처치.	24개월 이상 및 성인: 1회 0.1-0.3mL를 물이나 우유에 희석하여 1일 3회 6일간 복용.	원내외 통과
파킨슨병 치료제	[전문의약품] 온젠티스 캡슐 50mg opicapone 50mg 에스케이케미칼 생명과학	₩2,515/cap	레보도파/도파 탈탄산효소 억제제 표준요법으로 증상이 개선되지 않는 운동장애 증상을 동반한 파킨슨 증후군에 대하여 레보도파/도파 탈탄산효소 억제제의 보조치료제.	권장용량: 1일 1회 50mg. 본제는 취침전 레보도파/도파 탈탄산효소 억제제와 최소 1시간 이상 간격 두고 복용. 본제 투여 전후 1시간 공복상태 유지.	원외 통과
지 루제 기타 피부질환	[전문의약품] 휴메트린 정 Methylegonovine 0.125mg 희귀의약품센터-휴온스위탁 판매	비급여	태반만출 후, 분만 후, 유산 후 출혈, 자궁외 축부전의 출혈 방지 및 치료.	성인 1회 0.125-0.25mg 1일 2-4회.	원내외 통과 [원내외] 메틸러 정 – 희 귀의약품센터 공급 중단 으로 인한 대체지정