

약효 분류	약품명/성분명/제조사(판매사)	적응증	용법/용량	심의 결과
천식 & 만성폐쇄성폐질환 치료제	[전문의약품] 트렐리지 엘립타 25mg (1회 분무량) 중 Fluticasone 100µg Umeclidinium 62.5µg Vilanterol 25µg 글락소 스미스클라인	성인의 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 중등도 및 중증의 만성폐쇄성폐질환의 유지요법	• 1일 1회, 같은 시간에 1번 흡입.	원내외 통과
비타민을 포함한 칼슘 제제	[전문의약품] 디카맥스 디정 cholecalciferol 1000IU Ca 100mg 다림바이오텍	1. 다음 경우의 비타민 D의 보급: 임신 · 수유기, 발육기, 노년기. 2. 본제 함유 비타민 등의 효능 · 효과: 뼈 · 이의 발육불량, 구루병의 예방.	• 만 8세 이상 : 1일 1회 1정 복용.	원외 통과 (디카맥스 1000정 판매중지로 인한 대체통과)
고칼륨혈증치료제	[전문의약품] 로포타 현탁액 polystyrene sulfonate calcium 25g/100ml 대원제약	고칼륨혈증.	성인: 1일 15-30g을 2-3회로 분복, 경구투여.	원외 통과
갑상선호르몬제	[전문의약품] 씬지록신 정 50mcg levothyroxine sodium hydrate 0.05mg 씬지록신 정 88mcg levothyroxine sodium hydrate 0.088mg 씬지록신 정 125mcg levothyroxine sodium hydrate 0.125mg 다림바이오텍	갑상선기능저하증, 점액부종, 크레틴병, 단순성 갑상선종.	• 성인 1일 1회 25-400µg. 초회 25-100µg, 유지 100-400µg.	원외 통과
당뇨병 치료제	[전문의약품] 줄토피 플렉스터치 주 insulin degludec 100unit liraglutide 3.6mg 노보 노디스크제약	성인 제2형 당뇨병의 혈당 조절 향상 위해 다음의 경우 경구 혈당강하제와 병용 투여. 1) 경구 혈당강하제 병용 후 혈당조절효과 불충분한 경우 2) GLP-1 수용체 효능제와 경구 혈당강하제 병용 후 혈당조절효과 불충분한 경우 3) 기저 인슐린과 경구 혈당강하제 병용 후 혈당조절효과 불충분한 경우	1일 1회 SC, 가급적 일정한 시간에 투여. (하루 중 어느 때나 투여가능, 최소 8시간 간격) ※ 보험인정기준: 기저 인슐린(인슐린 단독 또는 메트포르민 병용) 투여에도 HbA1c가 7% 이상인 경우 *단, 기저인슐린과 메트포르민 병용 시만 인정됨 (단독사용시 보험인정 불가)	원내외 통과
구충제	[전문의약품][희귀의약품] 에가텐 정 (1Box=4정) triclabendazole 250mg 한국희귀의약품센터	간질성 또는 거대간질성 간디스토마 치료.	• 가급적 식사 후 투여 • 성인 및 만 6세 이상 어린이: 10 mg/kg 단회투여 → 불응성일 경우, 성인과 15세 이상 청소년 12hr or 24hr 간격두고 10 mg/kg, 2회 보충 투여	원외 통과
H2-Blocker	엑시드 캡셀 nizatidine 150mg 대웅	활동성 위·십이지장 궤양 치료 및 십이지장 궤양 재발방지, 내시경상으로 진단된 미란성 및 궤양성 식도염, 위식도 역류질환에 기인한 가슴쓰림 증상의 치료, 급성위염, 만성위염의 급성 악화기의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선.	• 성인: 활동성 위·십이지장궤양: 1일 1회(취침시) 300mg 또는 1회 150mg 1일 2회. • 십이지장궤양 재발방지: 1일 1회(취침시) 150mg. 위식도역류질환: 1회 150mg 1일 2회. • 위점막병변 개선: 1회 150mg 1일 2회.	원내/외 통과