

## 2022년 1차 의약품 관리위원회 통과신약 안내

약효 분류	약품명/성분명/제조사(판매사)	보험수가	적응증	용법	심의 결과
해열, 진통, 소염제	[전문의약품] <b>어린이 타이레놀 현탁액</b> <b>(1BTL=500ml)</b> <b>Acetaminophen 3.2g/100ml</b>  한국안센	₩18/1mL	감기로 인한 발열 및 동통, 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통, 치통, 관절통, 류마티양 동통.	만 12세 이하: 1회 10-15mg/kg, 4-6시간 간격 복용, 1일 최대 75mg/kg. 연령과 몸무게에 따라 용량 조절.	<b>원내외 통과</b>
식욕 촉진제	[전문의약품] <b>메게이스 에프 내복현탁액</b> <b>megestrol acetate 625mg/5ml</b>  보령제약	₩3,223/5mL/포	암 또는 AIDS 환자의 식욕부진, 악액질 또는 원인불명의 현저한 체중감소의 치료.	1일 1회 625mg(5mL)를 잘 흔들어 복용.	<b>원내외 통과</b> • [원내/외]대원 메게스트롤 이에스 현탁액 대체
식욕 촉진제	[전문의약품] <b>비씨 메게스트롤 현탁액20ml/p</b> <b>100ml 중</b> <b>Megestrol acetate 4000mg</b>  비씨월드제약	₩3,680/20mL/포	암 또는 AIDS 환자의 식욕부진, 악액질 또는 원인불명의 현저한 체중감소의 치료.	1일 800mg(20mL)을 잘 흔들어 복용.	<b>원내외 통과</b>
항혈소판제	[전문의약품] <b>피도빅스정</b> <b>Clopidogrel bisulfate 75mg</b>  한림제약	₩1,040/정	성인: 허혈뇌졸중, 심근경색, 말초동맥성 질환: 1일 1회 75mg. 급성관상동맥증후군: 부하용량 1일 1회 300mg. 유지용량 1일 1회 75mg. 1일 1회 아스피린 75-325mg 병용. 심방세동: 1일 1회 75mg. 1일 1회 아스피린 75-100mg 병용.		<b>원내외 통과</b> • [원내/외]클로렐정 대체
비타민 C를 포함하는 비타민 B군 제제	[전문의약품] <b>레날민 정</b> <b>ascorbic acid 60mg 외 8종</b>  일동제약	₩58/정	투석환자, 만성신부전에 의한 질소혈증 환자의 Vit B, C 보급.	• 성인 1일 1회 1정.	<b>원외 통과</b>
항경련제	[전문의약품][항정신성의약품] <b>환인 클로나제팜 정</b> <b>clonazepam 0.5mg</b>  환인	₩30/정	1. 간질 및 부분발작(초점발작): 초회량 1일 1.5mg, 3일 간격으로 0.5mg씩 증량, 유지량으로 1일 3-6mg 유지용량 도달 시 1일 1회 투여 2. 원발성 및 2차적으로 전신화된 강직간대발작(대발작) 3. 유-소아 간질(특히 정형성 및 비정형성 결신발작): - 소아(10-16세) : 초회량으로 1일 1-1.5mg을 2-3회 분할투여. 3일 간격으로 0.25-0.5mg씩 증량, 유지량 1일 3-6mg 투여 - 유아 및 소아(10세 이하 또는 체중 30kg 이하) : 초회량으로 1일 체중 kg당 0.01-0.03mg을 2-3회 분할투여, 3일 간격으로 0.25-0.5mg씩 증량, 유지량 1일 체중 kg당 0.1mg. 최대 용량은 체중 kg당 0.2mg 4. 공황장애: 초회량으로 1일 0.5mg을 2회 분할 투여. 3일 후 목표 용량인 1일 1mg으로 증량		<b>원내외 통과</b> • 리보트릴정 제조사 생산 중단으로 인한 대체약