

구분	약효 분류	약품명/성분명/제조사(판매사)	적응증	용량,용법	심의결과
1	항바 이러 스제	[전문의약품] 도바토 정 dolutegravir 50mg lamivudine 300mg 글락소 스미스클라인	본제의 개별 항레트로바이러스 성분에 대하여 알려진 또는 의심되는 내성관련 치환이 없는 성인 및 12세 이상(체중 40 kg 이상)의 인체면역결핍바이러스(HIV-1) 감염 치료.	음식물 섭취와 관계없이 투여 가능. 12세 이상(40 kg 이상): 1일 1회, 1정. (40 kg 미만인 청소년 및 성인은 투여 금기.)	원내외 통과
2	산동 제	[전문의약품] 마이오가드 점안액 0.125% 0.4ml/관(1회용) atropine sulfate 1.25mg/ml 라이트팜텍	진단 및 치료를 목적으로 하는 산동.	4~15세: 1일 1회 1적을 5분간격으로 총 3회 점안.	원내외 통과
3	축동 제	[전문의약품] 오큐카르핀 점안액 2% pilocarpine HCl 20mg/ml 삼일제약/삼일엘러간	녹내장, 진단 또는 치료를 목적으로 하는 축동.	1회 1-2방울, 1일 3-5회.	원내외 통과 • 이속토크핀 2% 점안액 대체
4	방광 & 전 립선 질환 치료 제	[전문의약품] 듀오다트 캡슐 dutasteride 0.5mg tamsulosin HCl 0.4mg 삼일제약	중등도~중증의 양성 전립선 비대증 증상의 치료	성인: 권장용량 1일 1회 1캡슐(두타스테리드 0.5mg 및 탐스로신염산염 0.4mg)	원내외 통과
5~7	항응 고제, 항혈 소판 제, 섬 유소 용해 제(혈 전용 해제)	[전문의약품] 카사반 정 10mg micronized rivaroxaban 10mg	10mg은 식사와 관계없이, 15mg 및 20mg은 식사와 함께 투여. 성인, 1. 비판막성 심방세동 환자: 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소: qd 20mg (=1일 최대량). PCI를 받은 환자: qd 15mg, 2. 급성 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료: 처음 3주간 1회 15mg, bid. 이후 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증 치료를 위한 유지량 및 재발위험 감소를 위한 권장량: qd 20mg . 1일 최대량: 치료 첫 3주간 30mg, 이후 20mg. 3. 하지의 주요 정형외과 수술(슬관절 또는 고관절 치환술)을 받은 성인 환자의 정맥혈전색전증 예방: qd 10mg . 고관절 치환술은 5주, 슬관절 치환술은 2주의 투여기간 권장.		원내외 통과
		카사반 정 15mg micronized rivaroxaban 15mg			원내외 통과
		카사반 정 20mg micronized rivaroxaban 20mg 비보존제약/이수애피스			원내외 통과
8	뇌기 능 개 선제	[전문의약품] 콜리티린 시럽(10ml=1p) choline alfoscerate 400mg 한국파마	뇌혈관결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군: 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성 저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력 감소	1회 400 mg, 1일 2-3회.	원내외 통과 • [원내/외]엘카틴 산 대체
9	고지 혈증 치료 제	[전문의약품] 로수벳 10/2.5mg rosuvastatin 2.5mg ezetimibe 10mg 한미	원발성 고콜레스테롤혈증(이형집합 가족형 및 비가족형) 또는 혼합형 이상지질혈증의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포 B 단백질, 트리글리세라이드 및 non-HDL-콜레스테롤을 감소시키고, HDL-콜레스테롤을 증가시키기 위한 식이요법의 보조제.	식사와 관계없이 1일 1회 투여. 본제 용량범위는 1일 10/2.5mg-10/20mg, 최대용량 1일 10/2.5mg 또는 10/5mg 권장. 1일 최대 10/20mg까지 증량가능.	원외 통과
10	고지 혈증 치료 제	[전문의약품] 리바로젯 정 4/10mg pitavastatin calcium 4mg ezetimibe 10mg JW중외	원발성 고콜레스테롤혈증(이형집합 가족형 및 비가족형) 또는 혼합형 이상지질혈증의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포 B 단백질, 트리글리세라이드 및 non-HDL-콜레스테롤을 감소시키고, HDL-콜레스테롤을 증가시키기 위한 식이요법의 보조제로서 투여.	성인: 식사와 관계없이 1일 1회 투여. 권장 최대용량: 1일 1회 2/10mg. 필요시 1일 최대 4/10mg 까지 증량가능. 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 용량 조절.	원외 통과

구분	약효 분류	약품명/성분명/제조사(판매사)	적응증	용량,용법	심의결과
11~ 12	혈압 강하 제	[전문의약품] 듀카브 정 30/5mg fimasartan 30mg amlodipine 5mg	피마사르탄칼륨 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압.	성인: 1일 1회 1정. 식사와 관계없이 물과 함께 복용. 가능한 매일 같은 시 간대 복용.	원외 통과
		듀카브 정 60/5mg fimasartan 60mg amlodipine 5mg 보령			원외 통과
13~ 14	소화 성궤 양용 제	[전문의약품] 넥시어드 정 20mg esomeprazole 20mg	- 위식도 역류질환(GERD), - 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법, NSAID 투여와 관련된 상부 위장관 증상치료의 단기요법, - 지속적인 NSAID 투여와 관련된 위궤양의 치료, 위궤양 및 십이지장궤양의 예방 - 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법.		원외 통과
		[전문의약품] 넥시어드 정 40mg esomeprazole 40mg 대웅제약			원외 통과
15~ 16	기타 의 중 추신 경용 약	[전문의약품] 와키스 필름코팅정 5mg pitolisant HCl 5mg	탈력발작을 동반하거나 동반하지 않는 성인의 기면증	성인: 아침 식사와 함께 복용. 1일 최 대 40mg. 1일 5mg~40mg 범위 내 에서 용량 조절 - 1주차 : 초회 qd 10mg. - 2주차 : 1일 20mg로 증량 또는 1일 5mg로 감량. - 3주차 : 최대 qd 40mg까지 증량 가능.	원외 통과
		[전문의약품] 와키스 필름코팅정 20mg pitolisant HCl 20mg 미쓰비시다나베파마			원외 통과