

2022년 3차 의약품관리위원회 통과신약 안내

구분	약효 분류	약품명/성분명/제조사(판매사)	보험수가 /Daily cost	적응증	용법/용량	심의결과
1	소염진통제	[전문의약품] 베아콕시브캡슐 200mg Celecoxib 200mg 휴온스	₩521/캡슐 ₩521~1,042/day	성인: 1. 골관절염: 200mg, 1일 1회 또는 1회 100mg, 1일 2회. 2. 류마티스성 관절염: 1회 100mg 또는 200mg, 1일 2회. 3. 강직척추염: 200mg, 1일 1회 또는 1회 100mg, 1일 2회. 6주 후 효과없을시 1일 400mg까지 투여가능. 1일 400mg 6주 투여후 효과없을시 다른 치료방법 고려. 4. 급성 통풍(수술후, 발치후 진통) 및 원발월경통: 초회 400mg, 필요시 첫날 200mg 추가 투여, 2일째부터 필요시 1회 200mg, 1일 2회.		원내/외 통과 ((원내/외)콕스비토 캡슐 200mg 대체)
2	항경련제	[전문의약품] 제비닉스 정 200mg eslicarbazepine acetate (micronized) 200mg	₩396/정	-뇌전증 성인에서 2차성 전신발작 동반 또는 동반하지 않은 부분발작 치료 단독요법 -만 6세 이상에서 2차성 전신발작 동반 또는 동반하지 않은 부분발작 치료 부가요법	음식과 관계없이 복용 가능. 1. 성인: 권장 초기용량 1일 1회 400mg. 1-2주 후 1일 1회 800mg로 증량. 유지용량 1일 1회 800mg, 반응에 따라 1일 1회 1200mg로 증량 가능.	원내/외 통과
3	인과용 윤활제	[전문의약품] 디쿠아솔 점안액 3% 0.5ml (1box=60tube) diquafosol sodium 30mg/ ml	₩470/0.5ml/관	안구건조증과 관련한 증상(각결막 상피 장애)의 개선.	1회 1적, 1일 6회 점안. 타 점안제와 병용시 최소 5분 이상 간격으로 투여.	원내/외 통과 ((원내/외)디쿠아솔 점안액 3% 0.4ml/관 대체)
4	부나장 치료제	[전문의약품] 비졸타점안액 0.024%, 2.5ml/btl latanoprostene bunod 0.24 mg/ml 바슈헬스코리아	₩14,095/2.5ml/병	• 개방각 녹내장, 고안압증의 안압하강	권장: 질환이 있는 눈의 결막낭에 1일 1회 저녁에 1적 . 최대 1일 1회.	원내/외 통과 ((원내/외)잘로스트스점안액 0.2ml/관 대체)
5	지양강장제	[전문의약품] 알기닉 액 20ml/포 L-arginine-L-aspartate 5g 티디에스팜	비급여(사입가 :₩5,000/20ml/포) 5,000원/day (사입가 기준)	정신적·신체적 기능무력 증상의 보조요법 회복기간(아미노산 결핍상태) 동안의 보조요법	12세 이상의 청소년 및 성인 : 1일 1회 1포	원내/외 통과
6	항응고제	[전문의약품] 릭시아나 정 15mg edoxaban 15mg 한국다이이찌산코/대웅	₩892/정	1.비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신색전증 위험 감소: 1일 1회 30mg(60kg 이하), 60mg(60kg 초과) . 2.심재성 정맥혈전증 및 폐색전증 치료/심재성 정맥혈전증 및 폐색전증 재발 위험 감소: 최소 5일간 비경구 항응고제 사용 후 1일 1회 30mg(60kg 이하), 60mg(60kg 초과) . 3. 1,2 효능/효과에서 다음 중 한 가지 이상 요인을 가진 환자: 1일 1회 30mg . - 중등증-중증 신장애($15 \leq CrCL \leq 50ml/min$) - P-gp 저해제(사이클로스포린, 드로네다론, 에리트로마이신, 케토코나졸) 병용. *고령, 비판막성심방세동, 출혈위험 ↑: $15 \leq CrCL \leq 30ml/min$: 1일 1회 15mg		원내/외 통과
7	혈압강화제	[전문의약품] 세비카 정 10/40mg amlodipine 10mg olmesartan medoxomil 40 mg 한국다이이찌산코	₩811/정 ₩811/day	암로디핀 또는 올메사르탄메독소밀 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압 치료.	1일 1회 1정 , 가능하면 매일 같은 시간 복용. 최대 10/40mg. 2주 이상 간격 두고 용량 조절.	원의 통과
8~10	혈압강화제	[전문의약품] 듀카브플러스 정 30/5/12.5mg fimasartan 30mg amlodipine 5mg hydrochlorothiazide 12.5mg	₩668/정 ₩668/day	피마사르탄칼륨과 암로디핀의 복합요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정, 식사와 관계없이, (가능한 같은 시간 복용 권장.) 본제 최대 투여용량 60/10/25 mg.	원의 통과
		[전문의약품] 듀카브플러스 정 60/5/12.5mg fimasartan 60mg amlodipine 5mg hydrochlorothiazide 12.5mg	₩809/정 ₩809/day			원의 통과
		[전문의약품] 듀카브플러스 정 60/10/12.5mg fimasartan 60mg amlodipine 10mg hydrochlorothiazide 12.5mg 보령	₩880/정 ₩880/day			원의 통과
11	위산분비억제제	[전문의약품] 케이캡 구강붕해정 50mg Tegoprazan 50mg 에이치케이이노엔(주)	₩1,300/정 ₩1,300/day	• 미란성, 비미란성 위식도역류질환(ERD, NERD): 1일 1회 50mg, 4주간 • 위궤양: 1일 1회 50mg, 8주간 • 소화성 궤양 및/또는 만성 위축성 위염에서의 헬리코박터파일로리 제균을 위한 항생제 병용요법: 본제 50 mg + 아목시실린 1 g + 클레리트로마이신 500 mg, 1일 2회 7일간. 식사과 관계없이 투여가능. 혀 위에 놓고 타액으로 녹여 복용하거나, 물과 함께 복용.		원의 통과