

구분	약품명	성분명	적응증/용법용량	약가	보관	제조/판매사	비고
원내/외	아피니토정 5mg	everolimus 5mg/tab	1. 비스테로이드성 아로마타제 저해제 불응, Estrogen R.(+), HER-2(-) 국소 진행성 또는 전이성 유방암, 폐경후 여성에서 엑스메스탄 병용, 2. 췌장에서 기원한 진행성 신경내분비종양 (pNET), 3. 위장관 또는 폐 기원의 진행성 고도 분화된 비기능적 신경내분비종양 (GI/Lung NET), 4. VEGF 표적요법 치료 실패한 진행성 신장세포암, 5. 치료적 중재가 필요하지만 근치적인 외과적 절제술을 받을 수 없는 결절성 경화증(TSC)과 관련된 뇌실막밑 거대세포 성상세포종(SEGA), 6. 즉각적인 수술이 요구되지 않는, 결절성 경화증(TSC)과 관련된 신장 혈관근육지방종. *용량: 1일 1회 1정	₩28,630/정	[차광실온보관]	한국노바티스	*응급가승인->정규승인
원내/외	하이그로톤정 25mg	chlorthalidone 25mg	본태성 고혈압, 신성 고혈압, 수축성 고혈압, 경증 내지 중등도의 만성 안정형 심부전, 부종(간경변, 신질환) : 1일 1회 25~50mg	₩53/정	[실온보관]	한림제약	
원내/외	하이페질정 3mg	donepezil 3mg	알츠하이머형 치매증상 치료 :1일 1회 1정	₩486/정	[실온보관]	현대약품	
원외	미라프 정 0.125mg	pramipexole dihydrochloride monohydrate 0.125mg	1. 특발성파킨슨증: 개시:0.375mg, 1일 3회, 5-7일마다 1회 증량. 유지: 1일 1.5-4.5mg, 1일 3회, 단독투여 혹은 레보도파(약 800mg/day)와 병용투여. 투여중단: 1일 0.75mg까지 0.75mg/day씩 감량, 이후 0.375mg/day씩 감량.	₩220/0.125mg	[실온보관]	현대약품	[원외]미라펙스정0.125mg 대체
원내/외	미라프 정 0.25mg	pramipexole dihydrochloride monohydrate 0.25mg	2. 특발성 하지불안증후군: 1일 1회, 0.125mg, 취침 2-3시간 전 복용. 필요한 경우 4-7일마다 증량가능	₩380/0.25mg			[원내외]미라펙스정 0.25mg 대체
원내/외	미라프 정 0.5mg	pramipexole dihydrochloride monohydrate 0.5mg		₩570/0.5mg			[원내외]미라펙스정0.5mg 대체
원외	미라프 정 1mg	pramipexole dihydrochloride monohydrate 1mg		₩1,200/1mg			[원외]미라펙스정 1mg 대체
원외	미라프서방정0.375mg	pramipexole dihydrochloride monohydrate 0.75mg		₩469/0.375mg			[원외]미라펙스서방정 0.375mg 대체
원외	미라프서방정 0.75mg	pramipexole dihydrochloride monohydrate 0.376mg	1. 특발성파킨슨증: 1일 1회 같은 시간에 식사와 상관 없이 복용. 개시요법: 0.375mg/day부터 점차증량, 5-7일마다 1회 정도증량. 2주 0.75mg/day, 3주 1.5mg/day, 이 이상의 증량이 필요시 1주 간격으로 0.75mg씩 증량, 1일 최대 4.5mg.	₩707/0.75mg			[원외]미라펙스서방정 0.75mg 대체
원내외	미라프서방정 1.5mg	pramipexole dihydrochloride monohydrate 1.5mg		₩1,039/1.5mg			[원내외]미라펙스서방정 1.5mg 대체
원외	에제페노정10/160mg	ezetimib 10mg fenofibrate 160mg	혼합형 고지혈증 환자의 상승된 Total-chol, LDL-C, Apo-B, non-HDL-C 감소: 1일 1회 1정 식후 즉시복용	₩1,057/정	실온보관	현대약품	