

2017. 7월 신약 응급 입고 알림

구분	약품명	성분명	제약사	보험수가	보험코드	약효분류	적응증	용법,용량
응급-원내/외	아로마신 정 25mg	exemestane 25mg	Pfizer	W4,682/정	648902630	호르몬을 이용한 항암 치료제	1. 항에스트로겐 치료에도 질병이 진전된 자연적 또는 인공적으로 폐경이 된 여성의 진행성 유방암(에스트로겐수용체 음성 환 자에서 유효성 입증되지 않음). 2. 에스트로겐 수용체 양성인 폐경기 이후 여성의 조기 유방암의 보조 치료(총 5년간 의 보조 호르몬 치료기간 중 2-3년간 타목 시펜 선행투여 후 나머지 기간 동안의 보조 치료).	성인 및 고령자: 1일 1회 25mg. 종양의 진행이 분명히 나타날 때까지 투여 계속. 기 타 자세한 내용은 제품설명서 참조.
응급-원내/외	타이커브 정 250mg	lapatinib 250mg	Glaxo Operations	W13,155/정	653602840	표적 항암 치료제	1. HER2(Humane Epidermal growth factor Receptor 2 protein, ErbB2)가 과발 현 되어 있고, 이전에 안트라사이클린계 약 물, 타산계 약물, 트라스투주맙을 포함하는 치료를 받은 적이 있는 진행성 또는 전이성 유방암 환자의 치료에 카페시타빈과 병용 투여, 전이성 유방암 환자는 트라스투주맙 의 치료 후 진행한 경우에 사용. 2. 호르몬 수용체가 음성이고 HER2가 과 발현되어 있는 전이성 유방암 환자로, 이전 에 트라스투주맙과 화학요법의 병용투여를 받고 진행된 환자의 치료에 트라스투주맙 과 병용 투여. 호르몬 수용체 양성이고 HER2가 과발현 되어 있는 전이성 유방암 인 폐경 후 여성 환자로, 현재 화학요법이 계획되지 않은 환자의 치료에 아로마타제 저해제와 병용 투여.	1. 카페시타빈과 병용 투여: 21일 주기. 1-21일째 본제 1,250mg, 1일 1회, 식전 1시 간 또는 식후 1시간. 1-14일 째 카페시타빈 2,000mg/m2/day(약 12시 간 간격으로 1일 2회) 병용, 식사 후 30분 이내 복용. 2. 트라스투주맙과 병용 투여 : 본제 1,000mg을 1일 1회 지속적 투여. 3. 아로마타제 저해제와 병용 투여: 본제 1500mg을 1일 1회 지속적 투여. 기타 자세한 내용은 제 품 설명서 참조.