

구분	약효분류	약품명/성분명/제조사	보험수가	적응증	용법, 용량	신청결과
응급	표적 항암 치료제	자카비 정 20mg Ruxolitinib 20mg Novartis	(전문) ₩54,192/정	1. 중간위험군 또는 고위험군 골수섬유화증의 치료 : 일차성 골수섬유화증, 진성적혈구증가증 후 골수섬유화증, 본태성혈소판증가증 후 골수섬유화증. 2. 진성적혈구증가증: 히드록시우레아에 내성 또는 불내성을 보이는 진성적혈구증가증의 치료	음식물과 관계없이 복용 가능. 1. 공수 섬유화증 혈소판 수 100,000-200,000/mm ³ 인 경우 15mg씩 1일 2회, 혈소판 수 >200,000/mm ³ 인 경우 20mg씩 1일 2회. 2. 진성적혈구증가증: 10mg씩 1일 2회. 이후 투여량은 안전성 및 유효성에 근거하여 조절. 최대량 25mg씩 1일 2회.	원내/외 승인
응급	기타 심혈관용제	레블레이드 정 25mg, 50mg Eltrombopag GSK	(전문) ₩35,443/25mg/정 ₩68,880/50mg/정	1. 코르티코스테로이드 또는 면역글로불린 또는 비장절제술에 충분한 반응을 보이지 않은 만성 면역성(특발성) 혈소판 감소증 환자에서의 저혈소판증 치료. 2. 만성 C형 간염 환자에서 인터페론 기반 요법의 시작 및 유지를 위한 저혈소판증 치료.	1.만성 면역성(특발성) 혈소판 감소증: 초기 용량 1일 1회 25mg. 용량 조절: 본제 투여 개시 후, 출혈 위험을 감소시키기 위해 필수적인 혈소판 수($\geq 50 \times 10^9/L$)에 도달 및 유지를 위한 용량을 조절. 1일 최대 50mg. 2.만성 C형 간염: 초회 1일 1회 25mg. 2주마다 25mg씩 용량조절. 1일 최대 75mg. 공복 시 복용. 타 약제와 병용시 최소 4시간 간격으로 투여	원내/외 승인
응급	세포독성 항암 치료제	티에스원 캡슐 20 gimeracil 5.8mg, tegafur 20mg, oteracil potassium 19.6mg 제일	(전문) ₩4,938/캡슐	위암: 진행성 및 전이성 또는 재발성 위암, 위암의 수술 후 보조화학요법, 두경부암: 진행성 또는 재발성 두경부암, 췌장암: 국소 진행성 또는 전이성 췌장암.	성인: 초회 체표면적 기준으로 1일 2회 28일간, 이후 14일간 휴약. 이를 1사이클로 하여 반복. • 1.25m ² 미만: 1회 40mg, • 1.25m ² 이상-1.5m ² 미만: 1회 50mg, • 1.5m ² 이상: 1회 60mg.	원내/외 승인
정기		티에스원 캡슐 25 gimeracil 7.25mg, tegafur 25mg, oteracil potassium 24.5mg 제일	(전문) ₩5,932/캡슐			
정기	표적 항암 치료제	렌비마 캡슐 4mg, 10mg Lenvatinib Eisai	(전문) ₩31,900/4mg/캡슐 ₩31,900/10mg/캡슐	방사성 요오드에 불응한, 국소 재발성 또는 전이성의 진행성 분화 갑상선암.	성인 1일 1회 24mg. 매일 같은 시간에 식사와 관계없이 경구 복용. 물과 함께 통째로 삼킴.	원내/외 승인
정기	표적 항암 치료제	타그리소 정 40,80mg Osimertinib AstraZeneca	(전문) ₩121,687/40mg/정 ₩227,356/80mg/정	이전에 EGFR-TKI로 치료 받은 적이 있는 T790M 변이 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 치료.	1일 1회 80mg. 매일 일정한 시간에 식사와 관계없이 복용.	원내/외 승인
정기	신경병증성 통증 치료제, 항전간제	카발린 캡슐 25mg, 50mg pregabalin 25mg, 50mg 씨제이헬스케어주식회사	(전문) ₩275/25mg/정 ₩439/50mg/정	1일 총 투여용량을 1일 2회로 분복, 음식물과 상관없이 투여. 1. 신경병증성 통증 1) 말초 신경병증성 통증 시작용량으로 1일 150 mg을 투여. 3-7일 후에 1일 300 mg까지 증량가능. 필요하다면, 이후 1주일 간격으로 1일 최대 600 mg까지 증량가능. 2) 중추 신경병증성 통증 시작용량으로 1일 150 mg을 투여. 1주일 후에 1일 300 mg까지 증량가능. 추가로 1주일 후에 목표 1일 용량인 600 mg까지 증량가능. 2. 간질 시작용량으로 1일 150 mg을 투여. 1주일 후에 1일 300 mg까지 증량가능. 필요하다면, 이 후 1주일 간격으로 1일 최대 600 mg까지 증량가능. 3. 섬유근육통 1일 300 mg-450 mg, 시작 용량으로 1일 150mg을 투여, 1주일 이내에 1일 300mg까지 증량가능. 추가로 1일 450 mg까지 증량가능.		원내/외 승인
정기	소화제	노자임캡슐 10000 pancreatin enteric coated tablet 162.7mg Nordmark	(일반) 비보험	췌장 외분비 기능장애.	1회 2-4캡슐(지방소화력단위 20000-40000EP단위), 1일 3회 식사중. (1일 최대 지방소화력 단위 15000-20000EP/kg을 넘지 않음).	원내/외 승인
정기	항바이러스제	베를리디 정 tenofovir alafenamide 25mg Gilead	(전문) ₩3,754/정	성인의 만성 B형 간염 치료	성인, 1일 1회 1정 식사와 함께 복용	원내/외 승인
정기	항우울제	노이로민 정 hyperici 80% methanol dried ext. 300mg 유유	(일반) (보)₩159/정	불안, 무기력 상태의 완화, 가볍고 일시적 우울증상.	12세 이상: 1회 300mg, 1일 3회. 소량의 물과 함께 씹지 말고 복용.	원내/외 승인

정기	기타 호르몬 조절에 관여하는 제제	클리마토플란 정 cimicifugae trituration D2 25 mg, ignatia trituration D3 25 mg, sepia trituration D2 25mg, sanguinaria trituration D6 25 mg DHU	(전문) 비보험	여성 갱년기 장애로 인한 다음 증상의 개선: 안면 홍조, 발한, 동계, 불안, 우울, 흥분.	초기 1회 1정, 1일 3회 복용. 증상이 개선되면 1일 복용횟수 감소 가능. 식전 30분 이전 또는 식후 30분 이후, 입에서 천천히 녹여서 복용.	원외 승인
정기	기타 비뇨생식기계용약	유로시트라-씨 산 citric acid 1002mg, potassium citrate 3300mg 동인당	(전문) ₩430/5g/포	요로결석 등과 같이 장기간 알칼리성 뇨의 유지를 필요로 하는 질환, 통풍치료시 요산배설약의 보조요법, 신 세뇨관 이상으로 인한 산성증의 치료.	성인: 1회 1포를 최소 180mL의 물 또는 주스에 타서 1일 4회 복용.	원외 승인
정기	기타 항생제	모누를 산 fosfomycin trometamol 3g/8g (역가) 팜비오	(전문) ₩8,184/8g/포	방광염·요도염 등 요로감염증, 무증후성 세균뇨, 수술전·후 요로감염 방지.	성인: 1회 3g 복용. 방지: 수술 3시간 전/24시간 후 3g(역가) 복용. 물 반 컵 또는 비알콜성 음료에 용해 후 공복 시 복용, 가능하면 취침 전 방광이 빈 상태에서 복용.	원내/외 승인
정기	비타민 및/또는 미네랄 제제	아로나민 씨 플러스 정 ascorbic acid 600mg cyanocobalamin 6µg biotin 22.5µg, ferrous fumarate 13.5mg, folic acid 250µg, nicotinic acid amide 50mg, pyridoxine HCl 5mg, Ca pantothenate 20mg, selenium 25µg fursultiamine HCl (TTFD-HCl, 활성비타민B1) 27.285mg, riboflavin butyrate 5mg, tocopherol acetate 20IU Zn 7.5mg 일동	(일반) 비보험	1. 비타민 B1, B2, B6, C, E 보급: 육체피로, 임신 수유기, 병중·병후, 노년기, - 비타민 B1: 신경통, 근육통, 관절통 증상 완화, 각기, 눈의 피로, - 비타민 C: 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착 완화, 잇몸출혈·비출혈 예방, 2. 아연 보급.	12세 이상: 1일 1회 2정 또는 1회 1정 1일 2회.	원내/외 승인
정기	항히스타민/항알러지제	루파핀 정 rupatadine fumarate 12.8mg 안국	(전문) ₩279/정	알레르기성 비염 및 두드러기 증상 치료	만12세 이상: 1일 1정	원내/외 승인 [원내/외]타리온 정 대체
정기	기타 심혈관용제	엔트레스토 필름코팅정 50mg, 100mg, 200mg Sacubitril-Valsartan Novartis	(전문) ₩2,243/정 (50mg, 100mg, 200mg 약가동일)	1. 만성 심부전: 좌심실 수축기능이 저하된 만성 심부전 환자(NYHA class II-IV)에서 심혈관 질환으로 인한 사망 및 심부전으로 인한 입원 위험성 감소. 2. 안지오텐신 수용체 길항제(ARB) 또는 안지오텐신전환효소(ACE) 억제제를 대신하여 다른 심부전 치료제와 병용 투여.	1. 성인: 초회량 1일 2회, 1회 100mg(사쿠비트릴/발사르탄으로서 48.6/51.4mg). 2. 안지오텐신전환효소(ACE) 억제제나 안지오텐신 수용체 길항제(ARB)를 복용하고 있지 않은 자 또는 이전에 상기 약물들을 저용량으로 복용하고 있던 자-초회량 1일 2회, 1회 50mg. -유지용량: 환자의 내약성에 따라 매 2-4주 간격으로 두배씩 증량하여 목표 유지용량인 1일 2회, 1회 200mg에 도달.	원내/외 승인
정기	항정신용제	쿠에타핀 정 12.5mg Quetiapine 12.5mg 환인	(전문) ₩170/정	1. 정신분열병. 성인: 식사와 관계없이 1일 2회. 처음 4일간 1일 총용량은 1일째 50mg, 2일째 100mg, 3일째 200mg, 4일째 300mg. 4일 이후부터 1일 300-400mg. 개인에 따라 150-750mg/day. 2. 양극성 장애. 성인 -양극성장애 1형과 관련된 조증상환의 급성 치료: 식사와 관계없이 1일 2회. 단독요법으로서 또는 기본안정제(리튬이나 발프로산)의 보조요법제로서 처음 4일간 1일 총용량은 1일째 100mg, 2일째 200mg, 3일째 300mg, 4일째 400mg, 6일째까지 1일 800mg까지 증량 가능, 1일 200mg 이하로 증량. 200-800mg/day 내 조절, 1일 유효용량은 400-800mg. -양극성장애와 관련된 우울증의 치료: 1일 1회 취침전, 처음 4일간 1일 총용량은 1일째 50mg, 2일째 100mg, 3일째 200mg, 4일째 300mg. 1일 권장량 300mg. -양극성 장애의 재발방지: 1일 2회, 1일 300-800mg 범위로 조절가능.		원내/외 승인