

구분	약효분류	약품명/성분명/제조사	보험수가	적응증	용법,용량	심의결과
정기	마취제 (국소&전신)	태준 리도카인비스코스 2% 액 (15ml/포) lidocaine HCl hydrate 2.13g/100ml 태준	(전문) ₩615/15ml/포	이비인후과 영역(구강·인두 점막의 자극, 염증시 국소마취), 치과 영역(X-선 촬영 또는 치과 인상시의 구역 억제). - 성인: 1회 최대 4.5mg/kg, 총 최대 300mg(15ml). 구강·인두 점막 자극, 염증 대증요법으로 300mg(15ml). 3시간 이내 재사용 불가, 1일 최대 7회. - 구강사용 시 이 약을 머금은 후 뱉으며 인후 사용 시 이 약을 머금은 후 연하시킬수 있다.		원내/외 승인
정기	지사제	람노스 캡슐 500mg Lactobacillus casei variety rhamnosus freeze-dried culture 500mg 한화	일반, 비보험 (₩180/cap)	장내균총의 정상화에 의한 정장 및 설사증상의 개선.	성인 250mg : 1일 2-8캡슐 500mg : 1일 1-4캡슐 *개봉후 1개월이내 사용(포장규격:30's, 90's)	원내/외 승인
정기	인슐린 제제	리조텍 플렉스터치 주 100IU/mL (3ml/카트리지) Insulin aspart 30unit, Insulin degludec 70unit 노보 노디스크	(전문) ₩16,876/3ml/카트리지	만 2세 이상의 당뇨병 치료 · 복벽, 상완, 허벅지에 피하 주사, 주사부위는 동일 부위 내에서 위치 변경. · 제2형 당뇨병: 1일 식사와 함께 10단위, 이후 개별 용량 조절. · 제1형 당뇨병: 1일 1회 식사와 함께 총 하루 인슐린 요구량의 60~70%, 나머지 식사시 단시간형/속효성 인슐린 투여. 이후 개별 용량 조절.		원외 승인
정기	인슐린 제제/항당뇨병제	솔리쿠아펜 주 (10-40) 3ml/펜 lixisenatide 0.05mg, insulin glargine, recombinant 3.6378mg 사노피	(전문) ₩39,501/3ml/펜	성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 - 메트포르민과 다른 경구 혈당강하제 병용 투여 이후 혈당조절효과가 불충분한 경우 이 약과 메트포르민을 병용 투여 - 기저 인슐린 단독 투여 이후 혈당조절효과가 불충분한 경우 이 약 투여 - 기저인슐린과 메트포르민 병용 투여 이후 혈당조절이 불충분한 경우 이 약과 메트포르민을 병용 투여	- (10-40) 펜의 하루 최대 용량은 40단위, (30-60) 펜의 하루 최대 용량은 60단위. - 이 약 투여 전에 메트포르민 외의 기저 인슐린 또는 경구 혈당 강하제 투여 중단. - 시작 용량은 이전의 항 당뇨병 치료를 근거로 하며, 리시세나티드의 권장 시작 용량 최대 10 µg. - 용법: 1일 1회, 매일 같은 식사 전 1시간 이내에 피하주사 (복부, 삼각근, 대퇴부 내에서 돌아가며)	원외 승인
정기	고혈압치료제	아모잘탄 플러스 정 5/50/12.5mg, 5/100/12.5mg 5/100/25mg amlodipine/ losartan/ chlorthalidone 한미	(전문) ₩974/5/100/12.5mg ₩988/5/100/25mg ₩813/5/50/12.5mg	암로디핀과 로사르탄의 복합요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정, 식사와 관계없이 가능하면 매일 같은 시간(예 : 아침)에 복용	원외 승인
정기	기타 항고혈압제	엑스원 정 10/160mg, 5/160mg, 5/80mg amlodipine/ valsartan 씨제이헬스케어주식회사	(전문) ₩1,021/10/160mg ₩976/5/160mg ₩732/5/80mg	암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압.	1일 1회 1정. 본제 투여 전 개개의 성분(암로디핀 또는 발사르탄)으로 용량 조절 권장.	원외 승인

2018년도 제 1차 약사위원회 통과신약

<p>정기</p>	<p>구강/인후 제제</p>	<p>카미스타드-엔 겔 lidocaine HCl hydrate 20mg, chamomilla tinc. (1:4.5) 185mg Stada/검인약품</p>	<p>비보험, 일반(₩13,000/통)</p>	<p>다음 질환에 의한 염증의 완화 : 경증의 구내염(입안염) 및 잇몸염</p>	<p>12세 이상 청소년 및 성인 : 1일 3회, 1회 약 0.5cm를 염증이 있는 부위에 바르고 부드럽게 문지른다.</p>	<p>원외 승인</p>
<p>재사용</p>	<p>식욕촉진 제</p>	<p>대원초산메게스테롤 현탁액 400mg/10ml megesterol acetate 대원제약</p>	<p>(전문) ₩1,680/포</p>	<p>암, AIDS 환자의 시기육부진, 약액질, 원인불명의 현저한 체중감소</p>	<p>1일 1포~2포</p>	<p>원내/외 승인</p>