

구분	약효 분류	약품명/성분명/제조사(판매사)	보험수가	적응증	용법/용량	심의 결과
응급	다제내성 결핵약	동인당 파스과립 ca. p-aminosalicylate 3.3g 동인당	₩436/cap	폐결핵, 기타 결핵증(다제내성 결핵)	성인: 150mg/kg/day(12~16g/day) 1일 2~3회 분복	원의 통과
정기	식욕촉진 제	대원 메게스트롤 이에스 현탁액 megestrol acetate 625mg/5mℓ 대원	₩3,543/5mL/포	암 또는 AIDS 환자의 식욕부진, 약액질 또는 원인불명의 현저한 체중감소의 치료.	1일 1회 625mg(5mL)를 잘 흔들어 복용.	원내/외 통과
정기	안과용 윤활제	디쿠아스-에스 점안액 3% 0.4mL (1box=30관) diquafosol tetrasodium 30mg/mℓ 산테	₩534/0.4mL/관	안구건조증과 관련한 증상(각결막 상피 장애)의 개선.	• 1회 1적, 1일 6회 점안. 타 점안제와 병용시 최소 5분 이상 간격으로 투여. • 점안 후 남은 액과 용기는 바로 버림.	원내/외 통과
정기	비타민 A, D, E	[일반의약품] 큐엔디 1000 연질캡슐 ubidecarenone 10mg, tocopherol acetate 10mg, cholecalciferol concentrated (oily form) 1mg 코스맥스바이오	비급여 (₩330/정)	1. 다음 경우의 비타민 D, E 의 보급 - 임신 · 수유기, 발육기, 노년기 2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. - 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방.	만 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용.	원의 통과
정기	면역 억제제	아드바그라프 서방캡슐 0.5mg Tacrolimus 0.5mg	₩2,202/cap	동종 신장·간이식 환자에 대한 거부반응 방지.	• 간이식: 성인 초기 0.2~0.5mg/kg 1일 1회 • 간이식: 성인 초기 0.1~0.2mg/kg 1일 1회 • 최대흡수 위해 공복상태 또는 식전 1시간 또는 식후 2~3시간투여. • 1일 2회 타크로리무스 일반형 제제에서 1일 1회 복용 본제로 전환 시: 1일 총투여량을 1:1(mg:mg)로 전환	원내/외 통과
		아드바그라프 서방캡슐 1mg Tacrolimus 1mg 아스텔라스	₩3,289/cap			
정기	항히스타민/항알러지제	알레그라 디 정 fexofenadine HCl 60mg, pseudoephedrine HCl 120mg 한독	₩182/정	계절 알러지성비염에 의한 다음 증상의 완화: 재채기, 콧물, 코 · 구강 · 인후의 가려움, 눈의 가려움, 눈물흘림증, 충혈, 비출혈.	12세 이상: 1회 1정 1일 2회. 음식물과 함께 섭취하지 않는 것이 바람직함.	원내/외 통과
정기	기타 중추신경용 제 및	누비질 정 150mg armodafinil 150mg	₩2,036/정	성인에 있어서, 기면증과 관련한 과다졸음	1일 1회 150mg (max. 250mg/day)	원의 통과
		누비질 정 250mg armodafinil 250mg 한독테바	₩2,980/정			
정기	철분제제	볼그레 캡슐 iron acetyltransferrin 200mg (40mg as iron) 종근당	₩449/cap	철결핍성 빈혈	철로서 1회 40mg(1캡슐), 1일 1~2회 공복 복용	원의 통과