

구분	약효 분류	약품명/성분명/제조사(판매사)	보험수가	적응증	용법/용량	심의결과
정 기	다제내성 결핵약	[전문(희귀의약품)] 서튜러 정 100mg bedaquiline fumarate 120.89 mg 얀센	₩158,000/정	18세 이상 성인의 다제내성 폐결 핵 에 대한 병용요법.	• 제 1-2주: 1일 1회 400mg. • 제 3-24주: 1회 200mg, 주 3회 (48시간 이상 간격). • 총 치료기간: 24주.	원외 통과
정 기	정장제	[일반의약품] 람노스 과립 1g/포 Lactobacillus casei variety rhamnosus 2×108 as living germs 250mg/g 한화	₩243/g/포	장내균총 정상화에 의한 정장 및 설사 증상 개선.	• 성인 2-8g/day, 2세이상 소아 1- 4g/day.	원외 통과
정 기	세포독성 항암치료 제	[전문의약품] 테모달 캡슐 100mg temozolomide 100mg	₩54,268/cap	1. 성인의 새로이 진단된 다형성 교아종의 치료. 초기에는 방사선 치료와 병용, 이 후 본제를 6주까지 반복 단독 투 여 가능. • 병용 치료 시: 1일 75mg/m2를 42일간 국소 방사선 치료와 병용하 면서 복용. • 단독 투여 시: 본제와 방사선 치료와 병용 기간이 끝나고 4주 경과 후 본제를 6주까지 단독투여 가능. • 1주기 때 150mg/m2를 5일간 투여 후 23일간 휴약. • 2주기 시작 시 CTC 비혈액학적 독성 수준이 2 이하(탈모, 오심, 구 토는 제외), 절대호중구 수치 1.5×109/L 이상, 혈소판 수치 100× 109/L 이상일 경우 200mg/m2로 증량. 2. 성인의 표준요법에 실패한 재발성, 진행성 다형성 교아종 및 미분 화성상세포종의 치료. • 전치료로 화학요법제 치료를 받지 않은 환자: 1일 1회 200mg/m2 을 5일간 복용 후 23일간 휴약, 총 28일이 한 주기. • 전치료로 화학요법제 치료를 받은 환자: 초회용량은 1일 1회 150mg/m2, 혈액학적 독성이 없을 경우 두 번째 주기부터 1일 1회 200mg/m2로 증량, 5일간 투여.		원내/외 통과
		[전문의약품] 테모달 캡슐 250mg temozolomide 250mg 엠에스디	₩128,831/cap			
응 급	ADHD 치 료제	[전문의약품] 메디키넷 리타드 캡슐 10mg methylphenydate HCl	₩361/10mg/cap	6세 이상의 소아, 청소년 및 성인 의 주의력결핍과잉행동장애 (ADHD)의 치료	1) 6세이상 소아 및 청소년: -1일 1회 아침 식후 즉시 투여 -초기용량으로 1회 5mg씩 1일 1 회(아침) 또는 2회(아침, 점심) 투 여, 환자의 치료반응과 내약성에 따라 매주 1일 용량을 5 ~ 10mg 씩 증량. Max. 60mg/day 2) 성인: 1일 2회 (아침, 점심) 식 후 즉시 투여 초기용량으로 1회 5mg, 1일 2회 (아침, 점심) 투여, 환자의 치료반 응과 내약성에 따라 매주 1일 용 량을 10mg씩 증량, Max. 1mg/kg/day, 1일 80mg을 초과해서는 안됨	원외 (메타데이트 CD캡슐 10,20,30mg 생산중단 인 한 대체약)
응 급	ADHD 치 료제	[전문의약품] 메디키넷 리타드 캡슐 20mg methylphenydate HCl	₩534/20mg/cap			원내/외 (메타데이트 CD캡슐 10,20,30mg 생산중단 인 한 대체약)
응 급	ADHD 치 료제	[전문의약품] 메디키넷 리타드 캡슐 30mg methylphenydate HCl 명인	₩669/30mg/cap			원외 (메타데이트 CD캡슐 10,20,30mg 생산중단 인 한 대체약)